WANETA



Photo: Cornell University, Ithaca, NY

Origine génétique	: Marcy X NY 115
Obtenteur	: Cornell University, Ithaca, New York
Disponible depuis	: 2011
Catégorie	: Croustilles et consommation

CARACTÈRES DESCRIPTIFS

Tubercule forme	: Rond à oblong de taille moyen à grand
Yeux	: peu profonds, uniformément répartis, à arcades moyennement proéminentes
Peau	: Lisse, beige clair, blanche à la base des yeux
Chair	: Blanche
Plante	: Semi-dressé, de type intermédiaire entre rameux et feuillus
Fleurs	: Violet - rouge

CARACTÈRES CULTURAUX ET D'UTILISATION

Rendement	: Bon
Densité	: Moyenne
Maturité	: Mi-saison à tardive
Résistances	: Gale commune – bonne Nématode dore de race Ro1 – résistante
Sensibilités	: Alternariose foliaire – modérément sensible Mildiou foliaire – modérément sensible PVY – sensible Gale poudreuse – modérément sensible
Aptitude à la conservation	: Bonne ; long repos végétatif
Qualité de consommation	: Excellente qualité de transformation à entreposage sous froid 45°F (7.2°C) avec noircissement et délitescence non-significatif lorsque bouillie
Remarques	: Le long report végétatif de Waneta peut expliquer son émergence lente au printemps. Tubérisation faible et les tubercules ont tendance à devenir gros avec peu de défauts externes. Faire attention à ce que la taille des tubercules ne devienne trop gros sinon l'incidence du cœur creux pourrait se situer entre 5 à 10%.