



# Anaplasmose

## Qu'est-ce que l'anaplasmose?

L'anaplasmose est une infection transmise par les tiques et causée par la bactérie *Anaplasma phagocytophilum*.

## Quels sont les symptômes?

Les cas d'infection sont généralement modérés ou légers, mais des cas plus graves de la maladie peuvent survenir. L'infection se manifeste généralement par de la fièvre et d'autres symptômes, comme des maux de tête, la fatigue et des douleurs musculaires. D'autres symptômes moins fréquents, comme les nausées, les vomissements et la diarrhée, peuvent également se manifester.

## Comment l'anaplasmose se transmet-elle?

L'anaplasmose est transmise par la morsure d'une tique à pattes noires infectée. La présence de tiques à pattes noires (*Ixodes scapularis*) a été répertoriée dans le centre-sud et le sud-est du Canada, notamment au Nouveau-Brunswick, et celle de la tique à pattes noires de l'Ouest (*Ixodes pacificus*) a été observée dans le sud-ouest du pays. De rares cas de transmission se sont produits lors d'une transfusion sanguine ou d'une transplantation d'organe.

## Comment l'anaplasmose est-elle diagnostiquée?

Le diagnostic de l'anaplasmose est fondé sur l'évaluation médicale des symptômes cliniques, les antécédents d'exposition aux tiques à pattes noires et des tests de laboratoire.

## Qui est à risque?

Le risque d'infection est plus élevé dans les régions où se trouvent les espèces de tiques et les agents pathogènes pouvant provoquer la maladie chez les humains. Des cas ont été signalés dans le centre-sud et le sud-est du Canada. Les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli risquent de développer une forme grave de la maladie.

## Comment peut-on prévenir l'anaplasmose?

Prenez garde aux tiques et repérez les endroits où elles sont les plus susceptibles de se trouver. Protégez-vous contre les morsures de tiques, vérifiez la présence de tiques quand vous revenez à l'intérieur, enlevez les tiques avec précaution et prenez les mesures nécessaires si vous observez des symptômes d'une maladie transmise par les tiques.

# FICHES D'INFORMATION DE A À Z SUR LA MALADIE

## Comment l'anaplasmose se traite-t-elle?

L'anaplasmose est traitée au moyen d'antibiotiques.

## Quel est le rôle de la Santé publique?

Les fournisseurs de soins de santé et les laboratoires doivent signaler les cas d'anaplasmose à la Santé publique. Le personnel de la Santé publique pourrait s'entretenir avec le fournisseur de soins de santé et le patient (ou les soignants) pour déterminer comment l'infection a été contractée, cerner toute autre personne à risque, mettre des mesures de lutte contre l'infection et transmettre tout autre conseil nécessaire.

## Renseignements supplémentaires

Pour tout autre renseignement, veuillez communiquer avec votre fournisseur de soins de santé, **votre bureau local de Santé publique** ou **Télé-Soins 811**.

## SITES WEB UTILES

[Maladies Transmises Par Les Tiques \(gnb.ca\)](http://gnb.ca)

Agence de la santé publique du Canada : [phac-aspc.gc.ca](http://phac-aspc.gc.ca)

---

Dernière révision : avril 2024