



La babésiose

Qu'est-ce que la babésiose?

La babésiose est une maladie rare, parfois grave, transmise par les tiques et causée par un parasite (*Babesia microti*) qui infecte les globules rouges.

Quels sont les symptômes?

De nombreuses personnes infectées ne présentent aucun symptôme. Certaines personnes atteintes de la babésiose peuvent présenter des symptômes pseudogrippaux légers, comme de la fièvre, des frissons, des sueurs, un mal de tête, des douleurs, une perte d'appétit, des nausées ou de la fatigue. La maladie peut aussi mener à un type particulier d'anémie appelé anémie hémolytique (une affection caractérisée par la destruction des globules rouges) et, dans de rares cas, au décès.

Comment la babésiose se transmet-elle?

La babésiose est transmise par la morsure d'une tique à pattes noires infectée. Il y a la tique à pattes noires (*Ixodes scapularis*), qui vit dans l'est et le centre du Canada, dont le Nouveau-Brunswick, et la tique occidentale à pattes noires (*Ixodes pacificus*), qui vit dans l'Ouest canadien. Dans de rares cas, la babésiose se transmet par transfusion de sang contaminé, durant la grossesse ou lors d'une transplantation d'organes solides. La babésiose ne se transmet pas d'une personne à l'autre.

Comment diagnostique-t-on la babésiose?

Le diagnostic de babésiose se fonde sur une évaluation par un médecin des symptômes du patient, sur l'exposition antérieure aux tiques à pattes noires et sur des analyses de laboratoire.

Qui risque de contracter une infection par la babésiose?

Le risque est plus élevé dans les zones géographiques où l'on trouve à la fois les espèces de tiques et l'agent pathogène pouvant provoquer la maladie chez l'humain. Des cas ont été signalés dans le sud-est et le centre-sud du Canada. L'âge avancé, un système immunitaire affaibli (par exemple, les gens atteints de cancer, les malades du VIH/sida ou les gens ayant reçu une greffe), des problèmes de santé graves ou l'absence de rate augmentent les risques de contracter une forme grave de la maladie.

Comment peut-on prévenir la babésiose?

La meilleure prévention passe par la sensibilisation. Prenez garde aux tiques et soyez au courant des endroits les plus susceptibles de contenir des tiques à pattes noires. Protégez-vous contre les morsures de

FICHES D'INFORMATION DE A À Z SUR LA MALADIE

tiques avec un insectifuge, vérifiez la présence de tiques après une activité extérieure, enlevez les tiques avec précaution, communiquez avec un fournisseur de soins de santé ou un pharmacien pour vous renseigner sur l'évaluation des morsures de tiques et consultez un fournisseur de soins de santé si vous observez des symptômes d'une maladie transmise par les tiques.

Comment traite-t-on la babésiose?

Un fournisseur de soins de santé pourra donner des conseils et proposer un traitement. Des médicaments sur ordonnance peuvent traiter efficacement la babésiose.

Il est possible de contracter une infection par la babésiose et une autre maladie transmise par les tiques en même temps. Veuillez parler à votre fournisseur de soins de santé et consulter un médecin si vous tombez malade après une morsure de tique.

Quel est le rôle de Santé publique?

Les fournisseurs de soins de santé et les laboratoires doivent signaler les cas de babésiose à Santé publique. Le personnel de Santé publique pourrait s'entretenir avec le fournisseur de soins de santé et le patient (ou les soignants) pour déterminer comment l'infection a été contractée, les autres personnes à risque et les mesures de lutte contre l'infection à mettre en place de même que pour donner tout autre conseil nécessaire.

Renseignements supplémentaires

Pour tout autre renseignement, veuillez communiquer avec votre fournisseur de soins de santé, votre **bureau local de Santé publique** ou **Télé-Soins 811**.

SITES WEB UTILES

[Maladies transmises par les tiques \(gnb.ca\)](http://maladies.transmises.par.les.tiques.gnb.ca)

Agence de la santé publique du Canada : phac-aspc.gc.ca

Dernière révision : mai 2024