



# Infection à *Borrelia miyamotoi*

## Qu'est-ce que l'infection à *Borrelia miyamotoi*?

L'infection à *Borrelia miyamotoi* est causée par une bactérie (*Borrelia miyamotoi*). Il s'agit d'une maladie relativement nouvelle et rare transmise par les tiques.

## Quels sont les symptômes?

Les personnes infectées par *Borrelia miyamotoi* présentent souvent des symptômes pseudo-grippaux, comme la fièvre, les frissons, les maux de tête, les douleurs corporelles et articulaires et la fatigue.

## Comment l'infection à *Borrelia miyamotoi* se transmet-elle?

L'infection à *Borrelia miyamotoi* est transmise par la morsure d'une tique à pattes noires infectée. Il y a la tique à pattes noires (*Ixodes scapularis*), qui vit dans l'est et le centre du Canada, dont le Nouveau-Brunswick, et la tique occidentale à pattes noires (*Ixodes pacificus*), qui vit dans l'Ouest canadien.

## Comment pose-t-on le diagnostic d'infection à *Borrelia miyamotoi*?

Le diagnostic d'infection à *Borrelia miyamotoi* est fondé sur l'évaluation des symptômes par le médecin, la possibilité d'exposition aux tiques à pattes noires et des analyses de laboratoire.

## Qui risque de contracter une infection à *Borrelia miyamotoi*?

Le risque est plus élevé dans les zones géographiques où l'on trouve à la fois les espèces de tiques et l'agent pathogène pouvant provoquer la maladie chez l'humain. Les chercheurs s'efforcent de déterminer où se trouve *Borrelia miyamotoi* et quelles sont les personnes les plus exposées au risque d'infection.

## Comment peut-on prévenir l'infection à *Borrelia miyamotoi*?

La meilleure prévention passe par la sensibilisation. Prenez garde aux tiques et renseignez-vous sur les endroits les plus propices à la présence de tiques à pattes noires. Protégez-vous contre les morsures de tiques avec un insectifuge, vérifiez la présence de tiques après une activité extérieure, enlevez les tiques avec précaution, communiquez avec un fournisseur de soins de santé ou un pharmacien pour vous renseigner sur l'évaluation des morsures de tiques et consultez un fournisseur de soins de santé si vous observez des symptômes d'une maladie transmise par les tiques.

# FICHES D'INFORMATION DE A À Z SUR LA MALADIE

## Comment traite-t-on l'infection à *Borrelia miyamotoi*?

L'infection à *Borrelia miyamotoi* se traite au moyen d'antibiotiques. Un fournisseur de soins de santé pourra donner des conseils et proposer un traitement.

## Quel est le rôle de Santé publique?

Les fournisseurs de soins de santé et les laboratoires doivent signaler les cas de *Borrelia miyamotoi* à Santé publique. Le personnel de Santé publique pourrait s'entretenir avec le fournisseur de soins de santé et le patient (ou les soignants) pour déterminer comment l'infection a été contractée, les autres personnes à risque et les mesures de lutte contre l'infection à mettre en place de même que pour donner tout autre conseil nécessaire.

## Renseignements supplémentaires

Pour tout autre renseignement, veuillez communiquer avec votre fournisseur de soins de santé, votre **bureau local de Santé publique** ou **Télé-Soins 811**.

## SITES WEB UTILES

[Gare aux tiques \(gnb.ca\)](http://gnb.ca)

Agence de la santé publique du Canada : [phac-aspc.gc.ca](http://phac-aspc.gc.ca)

---

Dernière révision : mai 2024