



Syphilis

Qu'est-ce que la syphilis ?

La syphilis est une infection transmissible sexuellement (ITS) causée par une bactérie (un germe) appelée *Treponema pallidum*. Une femme enceinte atteinte de syphilis risque de transmettre cette infection au fœtus, ce qui pourrait causer des anomalies congénitales ou même la mort.

Quels sont les symptômes ?

Ce ne sont pas toutes les personnes infectées par la syphilis qui présentent des symptômes. Il est parfaitement possible d'être porteur de la syphilis sans le savoir. En l'absence de traitement, la syphilis peut évoluer en quatre stades, lesquels présentent des signes et des symptômes différents.

Les symptômes les plus courants à tous les stades de la maladie sont :

- Maux de tête
- Étourdissements
- Changements au niveau de la vision
- Problèmes de coordination ou d'équilibre
- Perte auditive ou un bourdonnement dans les oreilles
- Problèmes de mémoire ou changements de personnalité

TYPES DE SYPHILIS	SYMPTÔMES
<p>Syphilis primaire <i>Contagieuse</i></p>	<p>De 3 à 90 jours après le contact :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un chancre (plaie ou ulcère) apparaît à l'endroit où le germe a pénétré dans l'organisme, habituellement le vagin, le pénis, l'anus et le rectum ou sur les lèvres et dans la bouche. • Un chancre est ferme, rond et petit. Comme il est indolore, il passe souvent inaperçu. • Ce chancre risque d'être confondu avec une lésion ou un herpès génital.

FICHES D'INFORMATION DE A À Z SUR LA MALADIE

	<ul style="list-style-type: none"> • Il peut se résorber sans traitement. Toutefois, la maladie progresse vers le stade secondaire
Syphilis secondaire <i>Contagieuse</i>	De deux semaines à six mois après le contact : <ul style="list-style-type: none"> • Le chancre peut être encore présent ou s'être résorbé. • Possibilité d'une éruption cutanée sous forme de taches rouges ou brunâtres, d'aspect rugueux sur les paumes et la plante des pieds. • Parmi les autres symptômes possibles, on compte la fièvre, l'enflure des nœuds lymphoïdes, l'irritation de la gorge, la perte de cheveux par plaques, la perte de poids et les douleurs aux muscles et aux articulations. • En l'absence de traitement, l'infection progresse au stade trois.
Syphilis latente <i>Contagieuse au tout au début</i>	La durée varie entre quelques mois et plusieurs années : <ul style="list-style-type: none"> • Au stade latent, le malade ne présente pas de symptômes. • Les organes internes sont les premiers à subir des dommages.
Syphilis tertiaire <i>Non contagieuse</i>	De 10 à 30 ans après le contact : <ul style="list-style-type: none"> • L'infection demeure dans l'organisme durant des années. • Si celle-ci n'est pas disparue dans les premiers stades, elle peut engendrer de graves problèmes de santé.

Comment la syphilis se propage-t-elle ?

- Cette infection se propage essentiellement lors de rapports sexuels vaginaux, anaux ou oraux non protégés avec une personne infectée.
- La bactérie entre dans le corps par les tissus qui tapissent la gorge, le nez, le rectum et le vagin.

FICHES D'INFORMATION DE A À Z SUR LA MALADIE

- Le contact direct (habituellement intime) avec les lésions lors des stades primaire et secondaire de l'infection représente le risque de transmission le plus important.
- Vous pouvez être exposé à la syphilis en entrant en contact direct avec les parties génitales, la bouche ou le rectum d'une personne infectée par celle-ci.
- Les femmes enceintes peuvent contaminer le fœtus avant la naissance ou le nouveau-né au moment de l'accouchement.
- Bien que cela se produise beaucoup moins fréquemment, la syphilis peut également se propager par le partage de matériel de consommation de drogue contaminé ou par des lésions cutanées.
- La syphilis ne s'attrape pas par contact avec les sièges de toilette, les poignées de portes, en se baignant dans les piscines, en échangeant des vêtements ou en mangeant avec les ustensiles d'une autre personne.
- Une année après avoir été infectés par la syphilis, la plupart des malades ne sont plus en mesure de propager l'infection.

Comment diagnostique-t-on la syphilis ?

- Le dépistage de la syphilis peut se faire au moyen d'un examen médical et d'une analyse de sang.
- Le dépistage peut également comprendre d'autres analyses de sang ou du liquide provenant des plaies afin de déterminer le stade actuel de la maladie.
- Les personnes qui envisagent de devenir enceintes ou qui le sont déjà devraient demander à leur fournisseur de soins de santé de procéder à un dépistage de la syphilis ou à un test de dépistage lors de l'une des visites prénatales.
- Il est également recommandé de subir des tests de dépistage d'autres infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS).

Comment traite-t-on la syphilis ?

- La syphilis peut être immédiatement traitée avec des antibiotiques, habituellement sous forme d'injection de pénicilline.
- À la fin du traitement, il est nécessaire de pratiquer des analyses sanguines pour confirmer que l'infection s'est résorbée.
- Évitez d'avoir des rapports sexuels non protégés qui pourraient vous exposer à un risque de réinfection jusqu'à ce que votre partenaire sexuel (ou vos partenaires sexuels) et vous ayez terminé votre traitement et qu'on vous ait confirmé que l'infection est terminée.

FICHES D'INFORMATION DE A À Z SUR LA MALADIE

Si l'on ne traite pas la syphilis, qu'arrive-t-il ?

La syphilis non traitée risque de se propager pour atteindre le cerveau, le cœur, les os ou de nombreux autres organes, ce qui, dans les cas graves, peut conduire à la paralysie, la cécité, la démence et même la mort.

Les femmes enceintes risquent d'infecter leur fœtus avec pour conséquence des anomalies congénitales ou même la mort (accouchement d'un mort-né). La peau, les os, les dents, les yeux, les ganglions lymphatiques, le foie, la rate et le cerveau de l'enfant peuvent être atteints. Les symptômes apparaissent rapidement après la naissance ou un peu plus tard durant l'enfance.

Qui est à risque de contracter la syphilis?

Les personnes à risque de contracter la syphilis sont celles qui ont des relations sexuelles avec un partenaire infecté ou celles qui appartiennent aux catégories suivantes :

- personnes ayant des contacts sexuels oraux, génitaux ou anaux non protégés;
- personnes ayant de multiples partenaires sexuels;
- personnes consommant des drogues par injection ou autrement;
- personnes qui ont déjà eu la syphilis ou qui sont atteintes d'une autre ITSS comme le VIH;
- personnes qui ont été sans-abris et qui ont vécu dans la rue.

Est-il possible de prévenir la syphilis ?

Les personnes qui sont actives sexuellement doivent :

- Limiter le nombre de partenaires sexuels et éviter les relations sexuelles avec des personnes dont elles ne connaissent pas les antécédents sexuels.
- Toujours utiliser des condoms pendant les relations sexuelles (vaginales, orales ou anales) ou une digue dentaire (une feuille de latex ou un condom masculin découpé et ouvert) lors des relations sexuelles orales.
- Éviter la consommation d'alcool et d'autres drogues qui pourraient altérer le jugement et engendrer des comportements à haut risque.

FICHES D'INFORMATION DE A À Z SUR LA MALADIE

Qu'en dit la santé publiques ?

Communiquez avec votre clinique locale de santé sexuelle ou votre fournisseur de soins de santé primaires pour effectuer un dépistage ou pour obtenir plus de renseignements sur la syphilis, ou si vous avez des questions sur le sujet. La Santé publique recommande que les Néo-Brunswickoises et Néo-Brunswickois sexuellement actifs subissent régulièrement un test de dépistage de toutes les maladies transmissibles sexuellement en même temps. Lors d'« un test de dépistage une fois pour toutes », votre échantillon sera analysé pour détecter la gonorrhée, la chlamydia, l'hépatite, la syphilis, le virus du papillome humain (VPH) et le VIH/sida.

Si vous recevez un diagnostic de syphilis, votre fournisseur de soins de santé pourrait demander à une infirmière en santé publique régionale de communiquer avec vous pour vous aider à contacter vos partenaires. Il sera peut-être nécessaire de tester tous les partenaires sexuels que vous avez eus au cours de l'année précédant le diagnostic de la maladie. Dans certaines circonstances, votre partenaire depuis longtemps, le cas échéant, et vos enfants pourraient également devoir subir un test de dépistage. Toutes les discussions sont strictement confidentielles.

Renseignements supplémentaires

Pour en savoir plus, communiquez avec votre fournisseur de soins de santé, le service Télé-Soins 811, un bureau régional de la Santé publique ou visitez le site Web du Nouveau-Brunswick sur les ITSS au : www.gnb.ca/santesexuelle

Dernière révision : Janvier 2025