



# SYPHILIS

## Qu'est-ce que la syphilis?

La syphilis est une infection transmise sexuellement (ITS) causée par une bactérie (un germe) appelée *Treponema pallidum*.

La syphilis est plus fréquente chez les hommes, mais peut aussi affecter les femmes. Une femme enceinte atteinte de syphilis risque de transmettre cette infection au fœtus, ce qui pourrait causer des anomalies congénitales ou même la mort.

## Quels sont les symptômes?

Ce ne sont pas toutes les personnes infectées par la syphilis qui présentent des symptômes. Il est parfaitement possible d'être porteur de la syphilis sans le savoir. Les symptômes sont identiques pour les hommes et les femmes. En l'absence de traitement, la syphilis évolue selon quatre stades :

<p><b>Syphilis primaire</b> <i>Contagieuse</i></p>	<p><b>De trois à 90 jours après le contact</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une plaie (chancre ou ulcère) apparaît à l'endroit où le germe a pénétré dans l'organisme, habituellement le vagin, le pénis, l'anus et le rectum ou sur les lèvres et dans la bouche.</li> <li>• Il s'agit d'une plaie ferme, ronde et petite. Comme elle est sans douleur, elle passe souvent inaperçue.</li> <li>• La plaie risque d'être confondue avec une lésion ou un herpès génital.</li> <li>• Elle peut se résorber sans traitement. Toutefois, la maladie progresse vers le stade secondaire.</li> </ul>
<p><b>Syphilis secondaire</b> <i>Particulièrement contagieuse</i></p>	<p><b>De deux semaines et six mois après le contact</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La plaie peut être encore présente ou s'être résorbée.</li> <li>• Une éruption cutanée sous forme de taches rouges ou brunâtres, d'aspect rugueux peut apparaître sur les paumes et la plante des pieds.</li> <li>• D'autres symptômes possible : fièvre, gonflement des ganglions, irritation de la gorge, perte de cheveux par endroits, perte de poids, douleurs aux muscles et aux articulations.</li> <li>• En l'absence de traitement, l'infection progresse au stade 3.</li> </ul>
<p><b>Syphilis latente</b> <i>Contagieuse au tout début</i></p>	<p><b>La durée varie entre quelques mois et plusieurs années</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Au stade latent, le malade ne présente pas de symptômes.</li> <li>• Les organes internes commencent à subir des dommages</li> </ul>
<p><b>Syphilis tertiaire</b> <i>Non contagieuse</i></p>	<p><b>De 10 à 30 ans après un contact</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'infection demeure dans l'organisme durant des années.</li> <li>• Si celle-ci n'est pas dépistée dans les premiers stades, elle peut engendrer de graves problèmes de santé.</li> </ul>

## Comment la syphilis se propage-t-elle?

- Cette infection se propage essentiellement lors de rapports sexuels vaginaux, anaux ou oraux, sans protection, avec une personne infectée.
- La bactérie entre dans le corps par les tissus qui tapissent la gorge, le nez, le rectum et le vagin.
- Le contact direct (habituellement intime) avec les lésions lors des stades primaire et secondaire de l'infection représente le risque de transmission le plus important.
- Vous pouvez être exposé à la syphilis en entrant en contact direct avec les parties génitales, la bouche ou le rectum d'une personne infectée par celle-ci.
- Une femme enceinte peut transmettre l'infection au fœtus avant la naissance ou au nouveau-né au moment de l'accouchement.

- L'infection peut être transmise, bien que beaucoup plus rare, lors de l'échange de seringues infectées pour la prise de drogue ou par lésions de l'épiderme.
- La syphilis ne s'attrape pas par contact avec les sièges de toilette, les poignées de portes, en se baignant dans les piscines, en échangeant des vêtements ou en mangeant avec les ustensiles d'une autre personne.
- Une année après avoir été infectés par la syphilis, la plupart des personnes ne sont plus contagieuses.

### Comment diagnostique-t-on la syphilis?

- La syphilis est diagnostiquée lors d'un examen médical et à l'occasion d'une analyse de sang.
- Vous devriez aussi subir d'autres examens de dépistage d'autres infections transmissibles sexuellement et par le sang.

### Comment traite-t-on la syphilis?

- La syphilis peut être immédiatement traitée avec des antibiotiques, habituellement sous forme d'injection de pénicilline.
- Après avoir été traité, vous devez subir des analyses de sang pour vous assurer que vous n'êtes plus infecté.
- Vous devez éviter d'avoir des rapports sexuels non protégés qui pourraient vous exposer à un risque de réinfection jusqu'à ce que vous et votre partenaire sexuel (ou vos partenaires sexuels) ayez terminé votre traitement et reçu la confirmation que l'infection est disparue.

### Si l'on ne traite pas la syphilis, qu'arrive-t-il?

- La syphilis non traitée risque de se propager pour atteindre le cerveau, le cœur, les os ou de nombreux autres organes, ce qui, dans les cas graves, peut conduire à la paralysie, la cécité, la démence et même la mort.
- Les femmes enceintes risquent de transmettre l'infection au fœtus, ce qui pourrait causer des anomalies congénitales ou même la mort (accouchement d'un mort-né). La peau, les os, les dents, les yeux, les ganglions lymphatiques, le foie, la rate et le cerveau de l'enfant peuvent être atteints. Les symptômes apparaissent rapidement après la naissance ou un peu plus tard durant l'enfance.

### Quelles sont les personnes qui risquent d'attraper la syphilis?

Les personnes qui ont des relations sexuelles avec un partenaire infecté ou celles qui appartiennent aux catégories suivantes :

- homme qui a des relations sexuelles avec d'autres hommes.
- personnes qui ont de multiples partenaires sexuels.
- consommateurs de drogues intraveineuses ou leurs partenaires.
- travailleurs du sexe ou leurs partenaires.
- personnes à qui on a déjà diagnostiqué une ITS.

### Est-il possible de prévenir la syphilis?

Les personnes qui sont actives sexuellement doivent :

- Limiter le nombre de partenaires sexuels et éviter les relations sexuelles avec des personnes dont elles ne connaissent pas les antécédents sexuels.
- Toujours utiliser des préservatifs lors d'une relation sexuelle (vaginale, orale ou anale). Pour le sexe oral, il faut utiliser une digue dentaire (une feuille de latex) ou un préservatif masculin dont l'extrémité est découpée.
- Éviter la consommation d'alcool et d'autres drogues qui pourraient altérer le jugement et engendrer des comportements à haut risque.

### Quel est le rôle de la santé publique?

- Si vous avez reçu un diagnostic de syphilis, votre fournisseur de soins de santé vous traitera et vous donnera des renseignements sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang.
- Il se peut qu'une infirmière de la santé publique communique avec vous pour vous aider à avertir vos partenaires.

Il se peut qu'il faille tester tous vos partenaires sexuels avec qui vous avez eu des relations sexuelles dans les douze mois précédant la découverte de la maladie.

- Votre partenaire à long terme et, si vous êtes une femme, vos enfants devront probablement faire l'objet d'un dépistage selon les circonstances.

Toutes les discussions restent strictement confidentielles.

### Renseignements supplémentaires

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec votre fournisseur de soins de santé, Télé Soins 811, votre bureau local de la santé publique ou visitez le [site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick](#).