

RAPPORT SUR L'ACTIVITÉ GRIPPALE AU NOUVEAU-BRUNSWICK

Période du rapport : du 19 janvier au 25 janvier 2014 (semaine 4)

Sommaire

Au Nouveau-Brunswick, l'activité grippale est toujours élevée.

Le pourcentage des détections positives de laboratoire demeure stable pour la troisième semaine consécutive.

Nouveau- Brunswick:

- Il y a eu 287 détections positives de la grippe durant la semaine 4, 1 est un virus A (H1N1)pdm09, 285 sont des virus A (non sous-typé) et 1 est un virus B.
- Le taux de consultations pour le syndrome grippal a augmenté mais se situait en-dessous des taux prévus pour ce temps de l'année.
- Cinq éclosions de syndrome grippal ont été signalées dans des écoles des régions 2,3, 6 et 7; une éclosion de grippe dans un foyer de soins a été signalée dans région 1.

Canada:

- Au cours de la semaine 04, l'activité grippale globale a diminué au Canada, en particulier dans l'ouest du Canada et en Ontario, qui ont connu un début précoce de la saison grippale. L'Île-du-Prince-Édouard était la seule province à signaler une activité grippale étendue.
- L'activité grippale globale au Canada au cours de la saison 2013-14 a été semblable à celle de la saison 2012-2013, et est dans les niveaux prévus pour cette période de l'année, bien que les adultes âgés de 20 à 64 ans ont été davantage touchés par la grippe cette saison.
- 2620 détections positives de la grippe ont été signalées durant la semaine 4 et la proportion des tests positifs pour l'influenza était de 24,3%.
- Le taux de consultations pour le syndrome grippal a diminué et se situait dans des taux prévus pour la semaine 4.
- Quatre nouvelles éclosions de grippe ont été signalées dans des établissements de soins de longue durée. Également, 3 éclosions de syndrome grippal ont été signalées dans d'autres établissements.

International :

- Infection humaine avec une grippe aviaire : En date du 30 janvier 2013, un total de 265 cas confirmés d'infection humaine par un virus de la grippe aviaire A(H7N9) ont été rapportés en Chine dont 57 décès. Il n'y a aucune preuve de transmission humaine continue.
- MERS-CoV : Depuis avril 2012, 180 infections humaines par le virus MERS-CoV ont été signalées, en Arabie saoudite, au Qatar, en Jordanie, au Royaume-Uni, aux Émirats Arabes unis, en Oman, au Kuwait, en France, en Allemagne, en Tunisie et en Italie. Parmi les 180 cas, 77 cas étaient mortels. L'apparition des premiers symptômes était d'avril 2012 jusqu'en janvier 2014.
- Nouveau virus de la grippe A :
 - Depuis l'été 2013, les États-Unis ont signalé 21 nouveaux cas d'infection humaine avec des variantes du virus de la grippe A (19 H3N2v et 2 H1N1v) provenant de l'Illinois, l'Indiana, l'Ohio, le Michigan, l'Arkansas et l'Iowa. Aucune transmission interhumaine n'a été identifiée. Tous les cas ont signalé un contact étroit avec des porcs.
 - Cette semaine, la Chine a signalé un cas humain de grippe A d'origine aviaire (H10N8) dans une femme d'âge moyen qui avait été exposé à un marché de volaille vivante. C'est le deuxième cas de H10N8 qui a été déclaré récemment.

1) Données provenant du laboratoire¹

- Le pourcentage des détections positives de laboratoire demeure stable depuis la semaine 2 et le virus de la grippe A (H1N1)pdm09 prédomine.
- 287 détections positives de la grippe ont été signalées au cours de cette période de rapport.

¹ Les échantillons de surveillance sont soumis par les praticiens recrutés par le Réseau des praticiens sentinelles de l'influenza du Nouveau-Brunswick (RPSI-NB). Ce réseau est composé de 8 sites en salles d'urgence, 3 sites en médecine familiale, 2 sites en Premières Nations, 1 site dans un foyer de soins, 3 sites dans les universités, et 8 sites dans les centres de santé communautaire. Les spécimens diagnostiques sont soumis par les médecins en milieu hospitalier et communautaire. Les données de laboratoire relatives à l'influenza comprennent les résultats provenant de spécimens diagnostiques ainsi que de surveillance. Tous les échantillons sont analysés au moyen d'une épreuve de PCR, qui consiste en une méthode rapide de détection conçue pour la détection de toutes les variantes connues de l'influenza A et B. Tous les cas confirmés en laboratoire sont signalés pour la semaine durant laquelle la confirmation du laboratoire est obtenue.

- Depuis le début de la saison, 897 détections positive de la grippe ont été signalées, 346 virus de la grippe A (H1N1)pdm09, 1 virus de la grippe A (H3), 546 virus de la grippe A (non sous-typé) et 4 virus de la grippe B.

Figure 1 : Nombre et pourcentage de spécimens positifs de grippe au Nouveau-Brunswick par semaine, jusqu'au 25 janvier 2014 (source des données : résultats du laboratoire Georges-Dumont).




Tableau 1 : Résultats de tests positifs d'influenza, par région sanitaire, au Nouveau-Brunswick jusqu'au 25 janvier 2014 (source des données : résultats du laboratoire G. Dumont)


| Région | Période du rapport: Jan./19/2014–Jan./25/2014 | | | | | | | Cumulatif: (saison 2013-2014) août/25/2013 –jan./25/2014 | | | | | | Cumulatif: (saison 2012-2013) août/26/2012 – août/24/2013 | | | |
|--------------------|--|----------|----------|-----------------|----------------------|----------|------------|---|----------|-----------------|----------------------|----------|------------|--|-----------------|-----------|-------------|
| | Niveau d'activité grippale ² | A | | | | B | Total | A | | | | B | Total | A | | B | Total |
| | | A(H1) | A(H3) | (H1N1) pdm09 | Non sous- typé | | | A(H1) | A(H3) | (H1N1) pdm09 | Non sous- typé | | | Non- (H1N1) pdm09 | (H1N1) pdm09 | | |
| Région 1 | Activité localisée | 0 | 0 | 1 | 155 | 0 | 156 | 0 | 1 | 174 | 270 | 0 | 445 | 527 | 13 | 18 | 558 |
| Région 2 | Activité localisée | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 76 | 154 | 0 | 230 | 211 | 3 | 8 | 222 |
| Région 3 | Activité localisée | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 30 | 43 | 0 | 73 | 85 | 9 | 1 | 95 |
| Région 4 | Activité sporadique | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 26 | 0 | 0 | 33 | 35 | 3 | 71 | 168 | 5 | 3 | 176 |
| Région 5 | Activité sporadique | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 21 | 20 | 1 | 7 | 28 |
| Région 6 | Activité localisée | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 25 | 26 | 0 | 51 | 252 | 5 | 50 | 307 |
| Région 7 | Activité localisée | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 89 | 2 | 11 | 102 |
| Total N.-B. | | 0 | 0 | 1 | 285 | 1 | 287 | 0 | 1 | 346 | 546 | 4 | 897 | 1352 | 38 | 98 | 1488 |

² Définition des niveaux d'activité grippale: <http://www.phac-aspc.gc.ca/fluwatch/13-14/def13-14-fra.php>

2) Taux de consultation pour le syndrome grippal (SG)³

- Au cours de la semaine 4, le taux de consultations pour le syndrome grippal était 31,4 consultations par 1,000 visites, et se situe en-dessous des taux prévus pour ce temps de l'année.
- Au cours de la semaine 4, le taux de participation des sentinelles était de 47% pour les médecins contribuant au programme national de surveillance de l'influenza « FluWatch » et pour le réseau des praticiens sentinelles de l'influenza du Nouveau-Brunswick (RPSI-NB).

Figure 2 : Taux de consultation pour le syndrome grippal (SG) au Nouveau-Brunswick, par semaine de déclaration, saison 2013/14 comparée aux saisons précédentes*.



* Le taux moyen fut calculé à partir des données des saisons 1996/97 à 2012/13 et excluant la saison pandémique (2009-2010).

³ Un total de 34 sites de praticiens (19 médecins contribuant au programme national de surveillance de l'influenza « FluWatch » et 15 sites provenant du RPSI-NB) ont été recrutés pour la saison 2013/2014 afin de signaler le nombre de patients présentant un SG par rapport au nombre total de consultations de patients durant une journée, et ce, une fois par semaine.

3) Syndrôme grippal (SG) et données relatives aux éclosions confirmées par le laboratoire :


Tableau 2 : Activité grippale/éclosions dans les foyers de soins et écoles du Nouveau-Brunswick pour la période du rapport, pour la saison courante et la saison précédente.

| | Période du rapport: Jan./19/2014–jan./25/2014 | | | Nombre cumulatif d'éclosions saison 2013-2014 | Nombre cumulatif d'éclosions saison 2012-2013 |
|-------------|---|---|---|---|---|
| | Nombre d'éclosions confirmées en laboratoire dans les foyers de soins* | Écoles signalant des éclosions de SG** | Nombre d'éclosions confirmées en laboratoire dans d'autres établissements* | | |
| Région 1 | 1 sur 13 | 0 sur 74 | 0 | 3 | 15 |
| Région 2 | 0 sur 15 | 1 sur 81 | 0 | 2 | 38 |
| Région 3 | 0 sur 14 | 1 sur 95 | 0 | 3 | 20 |
| Région 4 | 0 sur 6 | 0 sur 22 | 0 | 0 | 2 |
| Région 5 | 0 sur 2 | 0 sur 18 | 0 | 0 | 6 |
| Région 6 | 0 sur 9 | 2 sur 35 | 0 | 2 | 23 |
| Région 7 | 0 sur 4 | 1 sur 27 | 0 | 1 | 10 |
| Total N.-B. | 1 sur 63 | 5 sur 352 | 0 | 11 | 114 |

*Au moins deux cas de SG en sept jours et au moins un cas d'influenza confirmé en laboratoire. Les éclosions sont signalées pour la semaine où l'on obtient une confirmation par le laboratoire.

**Un taux d'absentéisme de plus de 10 % (ou un taux d'absentéisme étant plus élevé (i.e. 5-10%) que les niveaux de base attendus déterminé par les écoles ou les autorités de santé publique) et ce, apparemment attribuable au SG.

Figure 3 : Nombre d'éclosions d'influenza dans les foyers de soins¹ et d'éclosions de syndrome grippal dans les écoles² déclarées à la Santé publique au Nouveau-Brunswick, par semaine de rapport, saison 2013/14.



¹ Le programme national de surveillance de l'influenza "FluWatch" définit une éclosion dans un foyer de soins comme deux cas ou plus de syndrome grippal sur une période de 7 jours comprenant ou moins un cas confirmé en laboratoire.

² Le programme national de surveillance de l'influenza "FluWatch" définit une éclosion de syndrome grippal dans une école comme un taux d'absentéisme de plus de 10% (ou un taux d'absentéisme étant plus élevé (i.e. >5-10%) que les niveaux de base attendus déterminé par les écoles ou par les autorités de santé publique) et ce, apparemment attribuable au syndrome grippal.

Programme national de surveillance de l'influenza (FluWatch) – Pour un complément d'information sur l'activité grippale au Canada et dans le monde, consultez le site Web de l'Agence de santé publique du Canada à : <http://www.phac-aspc.gc.ca/fluwatch/index-fra.php>

Autres liens :

Mondial: http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/index.html

Europe: http://www.euroflu.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi et

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/Weekly_Influenza_Surveillance_Overview.aspx

PAHO: http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=805&Itemid=569

Australie: <http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cda-surveil-ozflu-flucurr.htm>

Nouvelle- Zélande: http://www.surv.esr.cri.nz/virology/influenza_weekly_update.php

Argentine: <http://www.msal.gov.ar/>

Afrique du sud: <http://www.nicd.ac.za/>

États-Unis: www.cdc.gov/flu/weekly/

Préparé par l'Unité de contrôle des maladies transmissibles
Bureau du médecin hygiéniste en chef, tél. : 506-444-3044