

Vaccin polysaccharidique 23-valent contre le pneumocoque (Pneu-P-23)

Qu'est-ce que le vaccin Pneu-P-23?

Le Pneu-P-23 est un vaccin sûr et efficace qui protège contre 23 souches (types) de bactéries *Streptococcus pneumoniae* à l'origine de la maladie pneumococcique. Le vaccin est autorisé par Santé Canada.

Qui devrait recevoir le vaccin Pneu-P-23?

Au Nouveau-Brunswick (N.-B.), le vaccin est offert gratuitement dans le cadre du calendrier d'immunisation systématique du N.-B. pour:

1. Toutes les personnes de 65 ans et plus : **Une dose** seulement est recommandée (même s'ils ont déjà reçu une dose avant l'âge de 65 ans-en fonction d'autres critères d'éligibilité).
2. Personnes ayant récemment été admises dans un établissement de soins de longue durée devraient recevoir **une dose**
3. Personnes à risque élevé de maladie pneumococcique invasive

Pour les professionnels de la santé, veuillez consulter notre [Guide d'immunisation du Nouveau-Brunswick](#) (GINB) ; section : [Critères d'admissibilité pour les vaccins financés par l'État au NB](#) pour obtenir tous les détails sur les critères d'admissibilité au Nouveau-Brunswick.

Veuillez consulter votre fournisseur de soins de santé afin de savoir si vous êtes admissible au vaccin. Les vaccins antipneumococciques sont offerts gratuitement aux personnes qui sont admissibles et une prescription d'un fournisseur de soins de santé n'est pas nécessaire. Les personnes qui ne sont pas admissibles pour ce vaccin mais qui souhaitent le recevoir peuvent le faire, à un certain coût, et doivent consulter leur fournisseur de soins de santé.

Quels sont les avantages du vaccin Pneu-P-23?

La bactérie peut provoquer des infections graves et potentiellement mortelles, comme une méningite (une infection de la muqueuse qui recouvre le cerveau), une septicémie (une infection du sang) et une pneumonie (une infection des poumons)

Le vaccin est le meilleur moyen de se protéger contre une infection à pneumocoques, une maladie grave et parfois mortelle. Plus de 90 % des infections à pneumocoques sont causées par ces 23 souches.

Lorsque vous vous faites vacciner, vous contribuez également à protéger les autres.

Le vaccin Pneu-P-23 est-il sécuritaire?

Ce vaccin est extrêmement sûr. Il est beaucoup plus sûr de se faire vacciner que de contracter une infection pneumococcique, qui peut être très grave.

Comment le vaccin Pneu-P-23 est-il administré?

Ce vaccin est administré par injection dans le muscle de la partie supérieure du bras chez les enfants plus âgés et les adultes.

Qui ne devrait pas recevoir le vaccin Pneu-P-23 ?

Si vous avez eu une réaction potentiellement mortelle à une dose précédente de vaccin antipneumococcique, ou à tous ingrédients du vaccin ou de son contenant, vous devez en parler à votre fournisseur de soins de santé ou à une infirmière de la santé publique.

Quels sont les effets secondaires possible du vaccin Pneu-P-23

Les réactions au vaccin sont généralement faibles et durent d'un à deux jours. Les réactions les plus fréquentes au site d'injection du vaccin sont la douleur, la rougeur et l'enflure. De la fièvre peut également se manifester.

Quel que soit le vaccin, il existe toujours un risque d'anaphylaxie, soit une réaction allergique constituant un danger de mort, mais la probabilité est extrêmement faible (moins d'un cas par million de personnes vaccinées). C'est pourquoi il est important de demeurer à la clinique pendant 15 minutes après l'administration du vaccin. La réaction anaphylactique est caractérisée par une éruption cutanée, de la difficulté à respirer et un gonflement de la gorge, de la langue ou des lèvres. Il existe des traitements pour cette réaction. Toute réaction grave ou inattendue doit être signalée à votre fournisseur de soins de santé.

Que peut-on faire en cas de réaction au vaccin Pneu-P-23?

Une compresse froide posée sur le site d'injection peut permettre de réduire l'inconfort.

En cas d'inconfort et de fièvre, vous pouvez prendre ou donner à votre enfant un médicament en respectant les instructions du fabricant. Demander For discomfort and fever, you can take or give your child medicine by following the manufacturer's instructions. Demandez à votre fournisseur de soins de santé lequel serait le plus efficace.

Vous ne devez PAS donner d'aspirine (AAS) aux enfants de moins de 18 ans en raison du lien de ce médicament avec le syndrome de Reye.

Y a-t-il d'autres renseignements utiles?

Veillez informer la personne qui vous administre le vaccin de tout problème de santé et de toute allergie. Votre vaccinateur vous fournira une preuve d'immunisation.

Veillez conserver ce document dans un endroit sûr et l'apporter lors de votre prochaine vaccination.

Si vous avez des réactions inhabituelles au vaccin ou si vous avez des questions ou des inquiétudes, veuillez communiquer avec votre fournisseur de soins de santé.

Sites internet utiles

- Gouvernement du Nouveau-Brunswick: [Maladie pneumococcique \(maladie pneumococcique invasive ou MPI\) \(gnb.ca\)](https://www2.gnb.ca/eng/maladie_pneumococcique_maladie_pneumococcique_invasive_ou_mpi.html)
- Agence de la santé publique du Canada: [Vaccins contre le pneumocoque : Guide canadien d'immunisation - Canada.ca](https://www.canada.ca/fr/santee/immunisation/guide-immunisation-canada.html)