



Vaccin conjugué 15-valent contre le pneumocoque (Pneu-C-15)

Qu'est-ce que le vaccin Pneu-C-15 ?

Pneu-C-15 est un vaccin sûr et efficace qui protège contre 15 souches (types) de la bactérie streptococcus pneumoniae responsable des maladies pneumococciques. Les vaccins conjugués contre le pneumocoque produisent une réponse immunitaire plus forte que les vaccins polysaccharidiques contre le pneumocoque.

Quels sont les avantages du vaccin Pneu-C-15?

Ces bactéries peuvent provoquer des infections graves et potentiellement mortelles telles que la méningite (infection de la membrane qui recouvre le cerveau), la septicémie (infection du sang) et la pneumonie (infection des poumons).

La vaccination est le meilleur moyen de vous protéger et de protéger votre entourage contre les infections à pneumocoques.

Comment le vaccin Pneu-C-15 est-il administré?

Le vaccin Pneu-C-15 est administré par injection aux jeunes enfants dans la cuisse ou dans la partie supérieure du bras.

Qui devrait recevoir le vaccin Pneu-C-15?

Dans le cadre du calendrier d'immunisation systématique du Nouveau-Brunswick, il est offert gratuitement à:

- Tous les enfants de moins de 5 ans au Nouveau-Brunswick. Ils doivent recevoir le vaccin à l'âge de deux, quatre et douze mois.

Qui ne devrait pas recevoir le vaccin Pneu-C-15?

Le vaccin est contre-indiqué si votre enfant :

- a déjà eu une réaction allergique grave au vaccin dans le passé; ou
- est allergique à un quelconque ingrédient du vaccin ou de son contenant.

Quels sont les effets secondaires possibles du vaccin Pneu-C-15?

Habituellement bénins, les effets secondaires durent généralement un ou deux jours. Parmi les réactions les plus courantes, citons de la douleur et une rougeur ou de l'enflure au point d'injection du vaccin. Certains enfants pourraient présenter des symptômes comme la fièvre, l'irritabilité, la somnolence ou la perte d'appétit.

Quel que soit le vaccin, il y a toujours une très rare possibilité (moins de un par million de personnes vaccinées) d'anaphylaxie, une réaction allergique constituant un danger de mort. Il est donc important de demeurer dans la clinique pendant les quinze minutes qui suivent l'administration du vaccin Pneu-C-15. Cette réaction est caractérisée par une éruption cutanée, de la difficulté à respirer, une enflure de la gorge, de la langue ou des lèvres. Il existe des traitements pour cette réaction.

Que peut-on faire pour atténuer les réactions au vaccin Pneu-C-15 ?

- Une compresse froide sur le site d'injection peut aider à diminuer l'inconfort.
- En cas d'inconfort et de fièvre, vous pouvez prendre un médicament en respectant les instructions du fabricant. Demandez à votre fournisseur de soins de santé lequel serait le plus efficace.
- Vous ne devez **PAS** donner d'aspirine (AAS) aux enfants de moins de dix-huit ans en raison de son lien avec le syndrome de Reye.

Toute réaction grave ou inattendue doit être signalée à votre fournisseur de soins de santé.

Où peut-on recevoir le vaccin Pneu-C-15?

Au Nouveau-Brunswick, les enfants peuvent être vaccinés par l'intermédiaire de leur [bureau local de Santé publique](#) ou d'un fournisseur de soins de santé primaires tel qu'un médecin de famille ou une infirmière praticienne.

Renseignements supplémentaires

Avisez votre vaccinateur si votre enfant souffre de problèmes de santé ou d'allergies.

Votre vaccinateur vous remettra un carnet de vaccination pour votre enfant. Gardez-le dans vos dossiers et apportez-le avec vous au prochain rendez-vous d'immunisation de votre enfant.

Si votre enfant a une réaction inhabituelle au vaccin, ou si vous avez des questions ou des inquiétudes, communiquez avec votre fournisseur de soins de santé.

Sites Web utiles :

- Gouvernement du Nouveau-Brunswick : [Vaccins et immunisation \(gnb.ca\)](#)
- Agence de la Santé publique du Canada: [Vaccins pour les enfants : À propos des vaccins - Canada.ca](#)
- Soins de nos enfants: [Vaccination | Soins de nos enfants \(cps.ca\)](#)

Dernière révision: Juin 2024