



Vaccin conjugué 20-valent contre le pneumocoque (Pneu-C-20)

Qu'est-ce que le vaccin Pneu-C-20 ?

Pneu-C-20 est un vaccin sûr et efficace qui protège contre 20 souches (types) de la bactérie streptococcus pneumoniae responsable des maladies pneumococciques. Les vaccins conjugués contre le pneumocoque produisent une réponse immunitaire plus forte que les vaccins polysaccharidiques contre le pneumocoque.

Quels sont les avantages du vaccin Pneu-C-20?

Ces bactéries peuvent provoquer des infections graves et potentiellement mortelles telles que la méningite (infection de la membrane qui recouvre le cerveau), la septicémie (infection du sang) et la pneumonie (infection des poumons).

La vaccination est le meilleur moyen de vous protéger et de protéger votre entourage contre les infections à pneumocoques.

Comment le vaccin Pneu-C-20 est-il administré?

Le vaccin Pneu-C-20 est administré par injection dans la partie supérieure du bras chez les adultes et dans la cuisse ou la partie supérieure du bras chez les jeunes enfants.

Qui devrait recevoir le vaccin Pneu-C-20?

Il est offert gratuitement dans le cadre du calendrier d'immunisation systématique du Nouveau-Brunswick aux:

- Personnes âgées de 65 ans et plus qui n'ont jamais reçu de vaccin contre le pneumocoque.

FICHE D'INFORMATION SUR LES VACCINS

- Personnes âgées de 18 ans et plus, nouvellement admises dans un établissement de soins de longue durée.
- Toutes les personnes (nourrissons, enfants et adultes) qui présentent des facteurs de risques médicaux et environnementaux les exposant à un risque élevé d'infections invasives à pneumocoque.

Vous pouvez demander à un fournisseur de soins de santé primaire de vérifier si vous êtes admissible à ce vaccin.

Qui ne devrait pas recevoir le vaccin Pneu-C-20?

Le vaccin est contre-indiqué si vous ou votre enfant :

- avez déjà eu une réaction allergique grave au vaccin dans le passé; ou
- êtes allergique à un quelconque ingrédient du vaccin ou de son contenant.

Quels sont les effets secondaires possibles du vaccin Pneu-C-20?

Habituellement bénins, les effets secondaires durent généralement un ou deux jours. Parmi les réactions les plus courantes, citons de la douleur et une rougeur ou de l'enflure au point d'injection du vaccin. Certains enfants pourraient présenter des symptômes comme la fièvre, l'irritabilité, la somnolence ou la perte d'appétit.

Quel que soit le vaccin, il y a toujours une très rare possibilité (moins de un par million de personnes vaccinées) d'anaphylaxie, une réaction allergique constituant un danger de mort. Il est donc important de demeurer dans la clinique pendant les quinze minutes qui suivent l'administration du vaccin Pneu-C-20. Cette réaction est caractérisée par une éruption cutanée, de la difficulté à respirer, une enflure de la gorge, de la langue ou des lèvres. Il existe des traitements pour cette réaction.

Que peut-on faire pour atténuer les réactions au vaccin Pneu-C-20 ?

- Une compresse froide sur le site d'injection peut aider à diminuer l'inconfort.
- En cas d'inconfort et de fièvre, vous ou votre enfant pouvez prendre un médicament en respectant les instructions du fabricant. Demandez à votre fournisseur de soins de santé lequel serait le plus efficace.
- Vous ne devez **PAS** donner d'aspirine (AAS) aux enfants de moins de dix-huit ans en raison de son lien avec le syndrome de Reye.

Toute réaction grave ou inattendue doit être signalée à votre fournisseur de soins de santé.

Où peut-on recevoir le vaccin Pneu-C-20?

Les enfants peuvent être vaccinés par l'intermédiaire de leur [bureau local de santé publique](#) ou de leur fournisseur de soins de santé primaire.

Les adultes âgés de **moins de 65 ans** peuvent s'adresser à leur fournisseur de soins de santé primaire.

Les adultes âgés de **65 ans et plus** peuvent s'adresser à leur fournisseur de santé primaire ou à leur pharmacie locale. Veuillez consulter la [liste de toutes les pharmacies participantes](#) par zone.

Renseignements supplémentaires

Avisez votre vaccinateur si vous ou votre enfant souffrez de problèmes de santé ou d'allergies.

Votre vaccinateur vous remettra un carnet de vaccination pour vous ou votre enfant. Gardez-le dans vos dossiers et apportez-le avec vous au prochain rendez-vous d'immunisation.

Si vous ou votre enfant avez une réaction inhabituelle au vaccin, ou si vous avez des questions ou des inquiétudes, communiquez avec votre fournisseur de soins de santé primaire ou [la santé publique](#).

Sites Web utiles :

- Gouvernement du Nouveau-Brunswick : [Vaccins et immunisation \(gnb.ca\)](#)
- Agence de la Santé publique du Canada: [Vaccins pour les enfants : À propos des vaccins - Canada.ca](#)
- Soins de nos enfants: [Vaccination | Soins de nos enfants \(cps.ca\)](#)
- Agence de la Santé publique du Canada : [Vaccination pour adultes - Canada.ca](#)

Dernière révision: Juin 2024
